

var Consommateurs de stimulants longue durée (*Atlas*)

Description	Pourcentage de bénéficiaires de l'assurance maladie en Belgique âgés de 6 à 17 ans accomplis ayant, au cours de l'année de référence, entamé un traitement médicamenteux de stimulants (délivrance en officine publique d'au moins une dose journalière standard [DDD] d'un médicament portant le code ATC-3 N06B) d'une durée d'au moins 12 mois.	Code	stat_017_020_At
Codification	%	Variable(s) source(s)	<ul style="list-style-type: none"> SS00050-Quantité SS00135-Code CNK ATC_PHAR_L-Code ATC niveau 3
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Le remboursement des stimulants dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire est presque exclusivement prévu pour les jeunes âgés de 6 à 17 ans accomplis chez qui on a posé un diagnostic de TDAH. Par conséquent, les chiffres de l'Atlas se limitent à cette tranche d'âge. Vous trouverez davantage d'informations sur les tranches d'âge et les indications de médication sur le site 'Trajet de soins TDA/H' et dans l'avis n° 8570 du Conseil supérieur de la Santé. La durée du traitement est définie à l'aide du nombre de DDD remboursées au patient durant la 'durée de traitement'. Un traitement de longue durée correspond à une délivrance de 366 DDD minimum et est défini comme suit : <ul style="list-style-type: none"> La date du début de traitement correspond à la date de prestation de soins à laquelle le stimulant a été prescrit pour la première fois. Le nombre de DDD est additionné depuis la date de début afin de calculer la date de fin (provisoire). La date de fin est définitive en l'absence de nouveau remboursement dans un délai de six mois suivant cette date. Si, dans un délai de six mois suivant la date de fin provisoire, un autre conditionnement de ce médicament est remboursé, la durée de traitement se poursuit. Une nouvelle date de fin provisoire est alors définie en additionnant le nombre de DDD à la date de prestation de soins à laquelle les stimulants ont à nouveau été prescrits. Si plusieurs périodes de traitements sont en cours durant la même année civile, seule la période de traitement la plus longue est prise en considération dans ces données. La durée de traitement peut couvrir plusieurs années civiles. Dans ce cas, non seulement la durée de traitement au cours de l'année de référence, mais aussi la durée d'un traitement ayant eu lieu au moins durant une partie de l'année de référence sont prises en considération. Il est tenu compte des traitements de l'année précédant l'année de référence et de l'année suivant celle-ci. La dose journalière standard ou <i>Defined Daily Dose</i> (DDD) est l'unité de mesure internationale créée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle permet la comparaison de l'usage de différents médicaments. Il s'agit d'une estimation de la dose moyenne journalière que consomme par jour un adulte d'un poids corporel d'environ 70 kg dans son indication principale. L'utilisation des DDD a pourtant quelques limitations. Étant donné que le remboursement est prévu exclusivement pour les mineurs d'âge, cela ne peut, dans ce contexte, non plus être considéré comme une dose journalière. Il s'agit donc ici d'une estimation très approximative de la durée de consommation. L'âge de référence correspond à celui des bénéficiaires au 31 décembre de l'année de référence. Il s'agit ici uniquement de spécialités pharmaceutiques, à savoir des médicaments produits par des firmes pharmaceutiques. Ils sont remboursés par l'assurance maladie lorsque les conditions suivantes sont remplies : <ul style="list-style-type: none"> Le médicament figure sur la liste des spécialités pharmaceutiques dont le remboursement est prévu par l'assurance maladie. Le médicament a fait l'objet d'une prescription par un médecin, un dentiste ou une sage-femme. Le médicament est délivré par un pharmacien. 	Variable(s) équivalente(s)	<ul style="list-style-type: none"> cube_017_020-Consommateurs de stimulants longue durée stat_017_003-Volume DDD stimulants par 1 000 bénéficiaires par jour stat_017_007-Consommateurs de stimulants stat_017_017-Consommateurs de stimulants très courte durée stat_017_018-Consommateurs de stimulants courte durée stat_017_019-Consommateurs de stimulants durée moyenne stat_017_027-Consommateurs de stimulants dont la première dose a été prescrite par un médecin-spécialiste
		Mots clés	

- La classification ATC est un classement international créé par l'[Organisation mondiale de la santé](#) (OMS) qui répartit les principes actifs des médicaments en groupes selon l'organe ou le système sur lequel ils agissent et selon leurs caractéristiques thérapeutiques, pharmacologiques et chimiques.
- Les chiffres par unité géographique sont basés sur le domicile du bénéficiaire au 31 décembre de l'année de référence. En cas de domicile inconnu à cette date, on utilise le domicile au 30 juin. Les personnes sans domicile connu ne sont comptabilisées que dans les chiffres du niveau 'Belgique'.
- Vous trouverez davantage d'informations dans le Chiffre-clé Atlas sur le thème de la [consommation de stimulants en Belgique](#).

Fréquence et timing de la mise à jour : les statistiques de l'année civile 2 sont ajoutées chaque année durant le Q4.

Le plus petit niveau géographique disponible : Commune

Méthode de calcul

(Nombre de bénéficiaires [6 à 17 ans] comptant une délivrance d'au moins [366 DDD](#) de stimulants [[ATC-3 = N06B](#)] au cours de la période de traitement) / (Nombre de bénéficiaires [6 à 17 ans] comptant au moins [1 DDD](#) de stimulants [[ATC-3 = N06B](#)] au cours de l'année civile) / 100)

Disponible	2008
Référence recommandée	IMA_AIM (23/09/2025), stat_017_020, Atlas IMA_AIM (accessed on 16/02/2026)
Dernière mise à jour des métadonnées	23/09/2025